

SİNEGRA

Sildenafil Sitrat 50 mg-100 mg

Her an kalkışa hazır!


Sertleşme
sorununa karşı
etkili ve güvenilir
çözüm.^{1,2}



NOBEL

Referans: 1.Sinegra 100 mg KÜB 2.EAU Guidelines. Edn. presented at the EAU Annual Congress Milan 2023

40 yaş ve üstü erkeklerde genel ve yaşa bağlı ED prevalans değerleri*



2017 yılında Türk Androloji Derneği Erkek Seksüel Sağlığı Çalışma Grubunun 40 yaş üzeri 2.760 erkek üzerinde düzenlediği anket çalışmasının sonuçlarına göre sıklığı %33 olarak saptanmıştır.*





ED ile Diğer Hastalıklar Arasındaki İlişki

ED'si olan erkeklerin

- **%60'ında hiperlipidemi.**
- **%56'sında efor testi pozitifdir.**
- **%40'ında önemli koroner arter stenozu (koroner hastalık).**
- **%20'sinde diabetes mellitus (şeker hastalığı).**
- **%11'inde depresyon vardır.**



SİNEGRA

Sildenafil Sitrat 50mg-100mg



100 mg
Sildenafil
alan hastaların
ereksiyon
iyileşme oranı
% 84'ün
üzerindedir.¹

Ereksiyonlarında düzelme
bildiren hastaların %'si

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

**Tedavi sonrasında
ereksiyonlarınızda
düzelme oldu mu?²**

%25

Plasebo

%82

Sildenafil

Tedavi Grubu



SİNEGRA

Sildenafil Sitrati 50mg-100mg



-  Sildenafil'in etkisi 1 saat içinde başlar ve 6 saate kadar devam eder.¹
-  Sildenafil ve Alkol arasında klinik olarak önemli bir hemodinamik etkileşim yoktur.²
-  Sildenafil'in aç karnına alınması önerilir.¹
-  Sildenafil kullanımının miyokard enfarktüsü (kalp krizi) görülme oranlarında herhangi bir artışa neden olmaz.³
-  Sinegra 100 mg ve Sinegra 50 mg'lık tabletler çentikli olduğundan doz ayarlaması yapılabilir.¹





Yan Etkisi Düşük ED Tedavisi^{1,2,3}

İLAÇ

SİLDENAFİL

Yüzde kızarıklık

% 10

Burun Tıkanıklığı

% 4

Baş Dönmesi

% 2

Görme Bozukluğu

% 3



SİNEGRA

Başlama süresi

Sinegra'nın cinsel etkinlikten en az 1 saat önce alınması önerilir.

Etki süresi

Sinegra etkinliği, alımı takiben ilk 1 saat içinde görülür 4-6 saat boyunca devam eder.

Kimler Kullanabilir?

- Yetişkin erkeklerde erektil disfonksiyonun tedavisinde endikedir.
- Sinegra kadınlarda kullanım için endike değildir.
- 18 yaşından küçük hastalarda kullanılmamalıdır.
- Geriyatrik hastalarda doz ayarlaması gerekmemektedir.
- Klinik çalışmalar 87 yaşa kadar olan hastalarda yapılmıştır.

Kimler Kullanmamalı?

- Nitrat bileşikleri ve nitrik oksit açığa çıkaran ilaçlar (Nitrogliserin, isosorbid mononitrat, isosorbid nitrat, pentaeritritol tetranitrat, eritritol tetranitrat, isosorbid dinitrat / fenobarbital gibi) kullanan hastalar,
- Cinsel aktivitenin önerilmediği hastalarda (stabil olmayan anjina gibi ciddi kardiyovasküler bozukluklar ve ciddi kardiyak hastalıklarda),
- Non-arteritik anterior iskemik optik nöropatisi olanlar,
- Ciddi karaciğer yetmezliği,
- Hipotansiyon (Kan basıncı < 90/50 mmHg),
- Geçirilmiş miyokard infarktüsü olanlar,
- Retinitis pigmentosa gibi herediter dejeneratif retinal bozukluğu olanlar hastalarda kontrendikedir.

Uyarılar ve Ek bilgiler

- Sildenafil, sağlıklı gönüllülerde 80 mg/dl'lik ortalama maksimum alkol seviyelerinde alkolün hipotansif etkisini artırmamıştır.
- Etkinin başlaması, yemeklerle beraber alındığında aç karnına alınmasına kıyasla gecikebilir.
- Çentikli olduğu için doz ayarı yapılabilir.
- Sinegra'nın etkili olması için cinsel uyarının olması gereklidir.
- Sinegra ve diğer PDE5 inhibitörleri ya da diğer erektil disfonksiyon tedavilerinin birlikte kullanımının güvenliliği ve etkililiği çalışılmamıştır.



SİNEGRA

Sildenafil Sitrat 50_{mg}-100_{mg}

Her an kalkışa hazır!

Sertleşme
sorununa karşı
etkili ve güvenilir
çözüm.^{1,2}



Referans: 1.Sinegra 100 mg KÜB 2.EAU Guidelines, Edn. presented at the EAU Annual Congress Milan 2023

Kısa Ürün Bilgisi için
Kare Kodu cihazınıza
okutunuz.

