

Hepatit B Tedavisinde SUT Kriterleri

4.2.13 - Hepatit tedavisi

(3) Akut Hepatit B tedavisi

a) Akut hepatit B nedeniyle izlenen hastalarda ciddi akut HBV kliniği ve laboratuvar bulguları olan ($\text{INR} \geq 1,5$ veya PT normalin üst sınırından 4 saniyeden daha uzun olanlar ve sarılık dönemi > 4 hafta olanlar) hastalarda 4 hafta arayla iki kere HBsAg negatifliği elde edilene kadar Sağlık Bakanlığınca onaylı endikasyonu bulunan antiviral ilaçların bedeli Kurumca karşılanır.

4.2.13.1 - Kronik Hepatit B tedavisi

(1) İlk tedaviye başlamak için;

a) HBV DNA seviyesi 10.000 (10^4) kopya/ml (2.000 IU/ml) veya üzerinde olan hastalarda, bu durumun belirtildiği rapor ve eki tetkik sonuçlarına göre;

1- Erişkin hastalarda; karaciğer biyopsisinde Histolojik Aktivite İndeksi (HAI) ≥ 6 veya fibrozis ≥ 2 olanlar ile 2-18 yaş grubu hastalarda; “ALT normalin üst sınırının 2 katından daha yüksek ve karaciğer biyopsisinde HAI ≥ 4 ” veya “ALT düzeyine bakılmaksızın fibrozis ≥ 2 ” olan hastalarda veya,

2- Erişkin hastalarda; en az 3 ay ara ile tekrarlanan testlerde ALT normalin üst sınırının üzerinde ve FIB-4 skoru $> 1,45$ veya APRI $> 0,5$ üzerinde olanlarda, tedaviye pegile interferonlar veya oral antiviraller ile başlanabilir.

b) 40 yaş üzerinde ve HBV DNA 20.000 IU/ml veya üzerinde olan hastalarda biyopsi yapılmadan oral antiviraller ile tedaviye başlanabilir.

4.2.13.1.1 – Hepatit B’ye bağlı karaciğer sirozunda tedavi

(1) Karaciğer sirozunda HBV DNA (+) olan hastalarda tedaviye başlanılabilir ve bu durum raporda belirtilir. Tedavi süreleri; HBV DNA (+) olanlar için kronik hepatit B tedavisinde olduğu gibidir.

Kronik Hepatit B’ye bağlı karaciğer sirozu tanısı için, biyopsi kanıtı olmayan hastalarda, trombosit sayısının $150.000/\text{mm}^3$ ’ün altında veya protrombin zamanının 3 saniye ve/veya üzerinde olması koşulu aranır.

4.2.13.1.1 – Hepatit B'ye baęlı karacięer sirozunda tedavi

(1) Karacięer sirozunda HBV DNA (+) olan hastalarda tedaviye bařlanılabilir ve bu durum raporda belirtilir. Tedavi sřreleri; HBV DNA (+) olanlar ięin kronik hepatit B tedavisinde olduęu gibidir.

Kronik Hepatit B'ye baęlı karacięer sirozu tanısı ięin, biyopsi kanıtı olmayan hastalarda, trombosit sayısının 150.000/mm³'řn altında veya protrombin zamanının 3 saniye ve/veya řzerinde olması kořulu aranır.

4.2.13.1.4 Karacięer biyopsisi ile ilgili genel prensipler

(2) Tedaviye bařlamak ięin biyopsi yapılması gereken hastalardan; biyopsi ięin kontrendikasyon bulunan hastalarda [PT de 3 sn den fazla uzama veya trombosit sayısı <80.000 /mm³ veya kanama eęilimini artıran hastalıklar veya kronik břbrek yetmezlięi/břbrek nakli veya biyopsiye engel olacak konumda bir yer kaplayıcı lezyonun varlıęı veya karacięer sirozu veya karacięer nakli veya gebeler veya gebelikte tanı alarak tedavisi bařlananların tedavisinin devamında, biyopsiye engel teřkil edecek řekilde ciddi yeti yitimine neden olan psikotik bozukluęu ve zeka gerilięi olan hastalarda (biyopsi uyumunun olmadıęının psikiyatri uzman hekimlerince dřzenlenecek saęlık kurulu raporunda belirtilmesi kořuluyla)] karacięer biyopsisi kořulu aranmaz. Biyopsi kořulu aranmayan durumlar saęlık raporunda aęık olarak belirtilir.

